

Infektioidentorjuntayksikkö

Eritetahradesinfektio, kaksivaiheinen

Eritetahrat aiheuttavat tartuntavaaran ja siksi henkilökunnan tulee poistaa eritetahra ja desinfioida kontaminoitunut alue heti sellaisen havaitessaan. Eritetahran aiheuttanut tai sellaisen ensimmäisenä havainnut työntekijä huolehtii, että eritetahradesinfektio tulee tehdyksi. Vastuu eritetahradesinfektion toteuttamisesta kuuluu jokaiselle.

Eritetahradesinfektioon tarvittavien aineiden (**Erisan Oxy+ 2 %**) ja välineiden (kertakäyttöiset siivospyyhkeet tai vastaavat, paperia eritteen imeyttämiseen, kertakäyttöiset suojakäsineet jne.) tulee olla helposti saatavilla ja jokaisen tiedossa mistä ne löytyvät.

Tee eritetahradesinfektio seuraavasti:

- 1) Desinfioi kädet
- 2) Pue kertakäyttöinen suojakäsine (yhden käden tekniikka)
- 3) Poista erite imeyttämällä se esimerkiksi paperipyyhkeeseen
- 4) Laita käytetty paperipyyhe ja käsine roskapussiin
- 5) Desinfioi kädet
- 6) Pue uusi käsine käteen yhteen käteen, kaada toisella kädellä riittävä määrä eritetahradesinfektioainetta (**Erisan Oxy+ 2 %**) tahrakohdan päälle ja pyyhi pinta kuivaksi
- 7) Laita käytetty paperipyyhe ja käsine roskapussiin
- 8) Desinfioi kädet

Jos eritetahra on jo päässyt kuivumaan, voi eritetahradesinfektioainetta kaataa suoraan eritetahran päälle ennen alueen pyyhkimistä siten että eritetahra peittyy kokonaan.